Сто часов астрономии - 2014 ГАИШ МГУ

“Каннибализм” в мире Галактик

Расторгуев А.С.,
доктор физ.-мат. наук,
профессор кафедры
экспериментальной
астрономии МГУ им.
М.В.Ломоносова,
заведующий отделом
изучения Галактики и
переменных звёзд ГАИШ
МГУ <http://lnfm1.sai.msu.ru/~rastor>

**Наше место во Вселенной
и мир галактик:
иерархия структур**

Наша спиральная Галактика - Млечный Путь: вид в оптике

Звёзды, перемешанные
с облаками пыли

Размер Хаббловского сверхглубокого поля на небе

Созвездие Печи
(Fornax) на
южном небе

Много ли галактик во Вселенной ?
Какие они ?

Суммарная
экспозиция
Хаббла
~550 часов
за 10 лет

Всего 1
звезда в
кадре !

- Галактик
на небе в
сотни раз
больше,
чем звёзд !

Хаббловская схема классификации галактик по морфологическим типам (внешний вид, строение): начало XX века

“Камертонная” диаграмма

Эллиптические

Обычные спиральные

Спиральные с баром (перемычкой)

“Вечный” вопрос:

Есть ли эволюционная связь между галактиками разных типов на Хаббловской классификационной схеме?

Эллиптические галактики

M87 E1 (центр скопления в Деве)

M49 E2

M84 E3

M110 (группа M31) E2

- Правильные эллипсоидальные формы
- Практически нет газа, пыли и молодых горячих (голубых) звёзд; видны в основном старые (красные) звёзды
- Вращаются, как правило, медленно, но скорости звёзд на вытянутых орбитах достигают $\sim 200\text{-}300$ км/с

NGC 1132

Спиральные галактики:

Дисковидные; показывают богатство и многообразие форм и сложное многокомпонентное строение

Много газа и пыли (пыль: плохо для наблюдений)

Много молодых горячих (голубых) звёзд

Быстрое вращение (~200-300 км/с)

Спиральный узор

M74

M66

M33

M51

Туманность Андромеды: M31

NGC 2841

M 101

M 109

M 81

Пыль в спиральных галактиках

Неоднородное распределение галактик: Местная Группа галактик (Млечный Путь, Туманность Андромеды (M31) и их ярчайшие спутники)

Диаметр ~ 2 Мпк

MW
M31

M33, NGC598	S
M110, NGC205	S
M32, NGC221	E
SMC, NGC292	E
LMC	SB(s)m pec.
WLM, DDO221	Irr/SB(s)m
IC10	Ir+
CMa Dwarf	KBm/Ir+
Pis Dwarf	Irr
IC1613, UGC668	Irr
Phe Dwarf	IAB(s)m V
Leo A, Leo III	Irr
Sex B, UGC5373	Irr/SB(s)m
NGC3109	Ir+IV-V
Sex A, UGCA205	Ir+IV-V
NGC147, DDO3	Ir+V
Sgr DIrrG	dE5 pec.
NGC6822	IB(s)m V
Peg DIrrG	IB(s)m IV-V
Boo	Irr
Cet	dSph
CVn I	dSph/E4
CVn II	dSph
And III	dSph
NGC185	dE2
And I	DE3 pec.
Scl, E351-G30	dE3 pec.
And V	dE3
And II	dSph
For, E356-G04	dE0
Car, E206-G220	dSph/E2
	dE3

Современный списочный состав Местной Группы (~50 членов)

Ant	dE3	
Leo I, DDO74	dE3	
Sex	dE3	
Leo II, Leo B	dE0 pec.	
UMi	dE4	
Dra, DDO208	dE0 pec.	
Sgr DEllG	dSph/E7	
Tuc	dE5	
Cas	dSph	
Peg, And VI	dSph	
UMa I	dSph	
UMa II	dSph	
Vir Stream	dSph remn. ?	
Willman I	dSph/GC ?	
And IV	Irr ?	
UGCA86, 0355+66	Irr, dE/S0 ?	
UGCA92, EGB0427+63	Irr, S0 ?	

GR8, DDO155	Im V	nonmemb. ?
IC5152	IAB(s)m IV	nonmemb. ?
NGC55	SB(s)m	nonmemb. ?
Aqr, DDO210	Im V	nonmemb. ?
NGC404	E0/SA(s)0	nonmemb. ?
NGC1569	Irp+ III-IV	nonmemb. ?
NGC1560, IC2062	Sd	nonmemb. ?
Cam A	Irr	nonmemb. ?
Car II, Argo Dwarf	Irr	nonmemb. ?
ESO 347-8, 2318-42	Irr	nonmemb. ?
UKS 2323-326	Irr	nonmemb. ?
UGC9128, DDO187	Irp+	nonmemb. ?
Sex C	?	nonmemb. ?

Местная Группа - периферийная часть Местного Сверхскопления галактик (с центром в скоплении в Деве)

Диаметр ~ 40 Мпк

Ближние сверхскопления галактик и пустоты ("войды")

Как астрономы изучают историю Вселенной и её строение

Красное смещение спектральных линий $z = \Delta\lambda / \lambda$ характеризует не только скорость удаления галактик, но и их расстояние и видимый возраст

- **Эффект Доплера** в астрономии – основной способ измерения скоростей звёзд и галактик
- $z = \Delta\lambda / \lambda = V / c$
(c – скорость света, V – скорость источника)
- При удалении объекта $\Delta\lambda > 0$ – видим смещение спектральных линий в **красную сторону (красное смещение)**, а при приближении – в синюю сторону

- $z = \Delta\lambda / \lambda$ – “красное смещение”
- Э.Хаббл и В.Слайфер (1916-1929) – обнаружил “красный смещенный”

Исходная диаграмма Хаббла

галактик; гипотеза расширения

Вселенной:

красные смещения

близких галактик

пропорциональны

их расстояниям:

- $V \approx H_0 \cdot D$,
- $H_0 \approx 70 \text{ км/с/Мпк}$ – постоянная Хаббла

$H_0 \sim 500 \text{ км/с/Мпк}$

• $z = \Delta\lambda / \lambda$ – “красное смещение”

• Э.Хаббл и В.Слайфер (1916-1929) –

обна
гала
Всел
красн
близ
прог
их р

$H_0 = 72$

• $V \approx$

• $H_0 \approx 70$ км/с/Мпк –
постоянная Хаббла

- Чем дальше галактика, тем больше скорость её удаления от нас
- Чем дальше галактика, тем больше времени требовалось на то, чтобы её свет дошёл до нас

- Относительно близкие галактики мы видим такими, какими они были в момент испускания света, т.е. $T \approx D / c$ лет назад (в нерелятивистском случае) - **фактически заглядываем в прошлое - у астрономов есть "машина времени" !**

В релятивистском случае сложнее: время, на которое мы "заглядываем в прошлое", т.е время распространения света от изучаемой галактики с красным смещением z до нас, равно

$$T(z) = \int_0^z \frac{dz'}{H(z') \cdot (1 + z')}$$

где $H(z')$ - значение постоянной Хаббла для эпохи z' ($H_0 \approx 70$ км/с/Мпк - современное значение постоянной Хаббла)

- Связь между красным смещением $z = \Delta\lambda / \lambda$, возрастом Вселенной и "заглядыванием в прошлое"
- $z < 2.5$

Красное смещение, $z = \Delta\lambda / \lambda$

Возраст Вселенной, млрд. лет

Взгляд в прошлое - млрд. лет

- Связь между красным смещением $z = \Delta\lambda / \lambda$, возрастом Вселенной и "заглядыванием в прошлое"
- $2.5 < z < 10.5$

Хаббл XDF: Хаббловское сверхглубокое поле

Множество
галактик разного
возраста

До $z \approx 11.9$
(возраст Вселенной
в тот момент был
 $\sim 400-600$ млн. лет;
уже тогда были
галактики !)

Астрономические проекты, изменившие взгляд на природу и жизнь Вселенной

- **HST** - космический телескоп "Хаббл"
- **SDSS** - Слоановский обзор неба
- **2MASS** - "всенебесный" инфракрасный обзор
- **WMAP** и **Planck** - изучение неоднородностей
распределения реликтового излучения

Из космоса виднее...

Больше спектров, хороших и разных

ИК-диапазон: видим сквозь пыль

- **Современные успехи астрономии связаны с**

- **Использованием больших телескопов (с диаметром зеркал более 5 м; сейчас их более 10) в местах с хорошим астроклиматом, а также космических телескопов**

- **Разработкой и применением новых панорамных приёмников излучения с высоким квантовым выходом (ПЗС-матриц)**

- **Применением систем адаптивной и активной оптики для повышения эффективности наблюдений (оптика, ИК)**

- **Наблюдениями во всех диапазонах спектра (гамма - рентген - ультрафиолет - оптика - ИК - микроволновый - радио): всеволновая астрономия**

• Современные успехи астрономии связаны с

- Использованием больших телескопов (с диаметром зеркал более 5 м; сейчас их более 10) в местах с хорошим астроклиматом, а также космических телескопов

- Разработкой и применением новых панорамных приёмников излучения с высоким квантовым выходом (ПЗС-матриц)

- Применением систем адаптивной и активной оптики для повышения эффективности

Слабейшие звёзды, видимые глазом +6m (V)

- Самые слабые доступные телескопам звёзды:
+29...+30m (V)

Различия в блеске ~3-5 млрд. раз !!!

- У.Бойл и Дж.Смит - Нобелевская премия (2009) за изобретение ПЗС-приемников излучения (АТ&Т Bell Labs, 1969)

Figure 1. The Hubble Space Telescope Wide Field Camera 3 focal plane.

HST WFPC3

Мозаики:

HST (Hubble Space Telescope) NASA

Запущен в 1990
2.4-м зеркало

Крупнейший космический проект, один из наиболее эффективных космических телескопов

- **Направления работы:**
- **Прямые изображения и спектры:**
  - Заатмосферный UV (0.1-0.3 мкм)
  - Предельно слабые объекты ($\sim 30^m$), в т.ч. галактики с большими красными смещениями
  - Наблюдения с предельным (дифракционным) угловым разрешением (~ 0.1 угловой секунды)
  - Космическая астрометрия - расстояния и собственные движения звёзд на малом временном интервале
  - Распределение энергии в спектрах

• Направления работы:

• Прямые изс

- Заатмосфере

- Предельно

галактики с

Наблюдения с HST принесли революционные результаты во все области современной астрономии и космологии

- Наблюдения с предельным (дифракционным) угловым разрешением (~ 0.1 угловой секунды)

- Космическая астрометрия - расстояния и собственные движения звёзд на малом временном интервале

- Распределение энергии в спектрах

- *SDSS: Sloan Digital Sky Survey (I-III)*

*(начало - май 1998;
<http://www.sdss.org/>)*

- > 150 участников из > 25 институтов
- Основные задачи мегапроекта:
  - Получение изображений и измерение блеска всех объектов ярче 23^m
  - Изучение крупномасштабной структуры Вселенной, галактик и скоплений галактик
  - Поиск Сверхновых
  - Поиск новых звездных скоплений и карликовых галактик

• Наблюдения: 2.5-м телескоп в Apache Point, NM (США)

- Система Ричи-Кретьена
- светосила 1/5
- поле зрения 2.5° , 120Мрх
камера (30 CCD 2к x 2к)
- 2 оптоволоконных
эшельных спектрографа
(по 1000 волокон !),
спектр. разрешение
 $R \sim 1850 - 2200$ (± 10 км/с)

Планируется установка
“двойника” в южном
полушарии

- **Data Release 10 (2013):** покрытие неба
- Изображения: ~14555 кв. град. (~35% небесной сферы)
- Запланирована установка 2-го телескопа SDSS в ЮАР
- **Статистика:**
- ~1 млрд. изображений объектов (пределы $u=22^m$, $z=20.5^m$)
- ~3 млн. спектров, из них:
- ~1880000 галактик, ~312000 квазаров, ~730000 звёзд

- Карта покрытия неба на 2013

The Sloan Legacy Survey

(расстояния, в т.ч. по фотометрическим красным смещениям, 3D карты -

крупномасштабная структура Вселенной)

- **SEGUE, SEGUE-2 (Sloan Extension for Galactic Understanding and Exploration)** - поиск скоплений, карликовых галактик, приливных "шлейфов" - следов их распада

• 2MASS: Two Micron All Sky Survey

- Два 1.3-м телескопа на Mt. Hopkins, AZ (США) и СТЮО (Чили)
- “Всенебесный” фотометрический обзор
- 471 млн. звезд и ~2 млн. далеких галактик (до 16 зв. вел. в ИК полосах JHK, 1.2-2.2 мкм)
- **Основное преимущество:**
  - Удельное (в расчёте на 1 кпк расстояния) межзвездное поглощение света пылью в 4-5 раз меньше, чем в оптике (до центра Галактики - в 200 тыс. раз меньше !)
  - Видны далекие звезды и галактики

Башня в Аризоне
и 1.3-м телескоп

- **WMAP** и **Planck** – космические телескопы микроволнового (миллиметрового) диапазона, предназначенные для

Именно эти крошечные флуктуации плотности вещества на этой стадии существования Вселенной и породили наблюдаемый мир галактик, скоплений и звёзд

- Его современная температура – ***2.72548 K***, а интенсивность во всех направлениях практически одинакова, с небольшими (~ 0.00001) вариациями (флуктуациями)

WILKINSON MICROWAVE ANISOTROPY PROBE (WMAP)

Работа на орбите: 2001 - 2009

- Planck
- Работа на орбите: 2009-2013

Краткая история Вселенной

Time Since Big Bang

Major Events Since Big Bang

$z \sim 1100$
→

375000 лет
T ~ 3000K

Неоднородность РИ - отпечаток этой эпохи

- Реликтовое (космическое фоновое) излучение
- Особая фаза истории Вселенной - так наз. **“эпоха рекомбинации”**: при охлаждении первичной плазмы до температуры ~ 3000 К протоны и электроны объединяются в атомы водорода; начинается эра господства атомов (**$z \sim 1100$** , **возраст Вселенной в этот момент ~ 375000 лет**).
- **Реликтовое излучение (с длиной волны ~ 2 мм и температурой $T \approx 2.72548$ К)** - нынешний слабый “след” этой эпохи “отрыва” излучения от вещества: при дальнейшем расширении Вселенной **излучение ещё сильнее “остыло”**

Барионы, "тёмная материя" и "тёмная энергия"

- **Барионы:** протон, нейтрон, электрон (высокостабильные частицы), $\Lambda, \Sigma, \Xi, \Omega$ - гипероны, мезоны: это частицы, из которых состоит *обычное вещество*

Краткая история Вселенной

Предсказания теории первичного нуклеосинтеза (первые три минуты жизни Вселенной):

H (70% барионной массы) - водород,
 ^4He (25% барионной массы) - гелий
+ совсем немного D, Li, ^3He

Полная доля барионного вещества (по вкладу в плотность энергии) составляет примерно 4.6%, в то время как доля "тёмной материи" - около 23%

1998-2001: обнаружение ускоренного расширения Вселенной по Сверхновым Ia - "тёмная энергия"; её вклад в плотность энергии составляет почти 73%

• M.Kowalsky (2008):

Надёжные ограничения на вклады массы и "тёмной энергии":

Использованы данные по

- Сверхновым типа Ia,
- Сахаровским осцилляциям (BAO, Eisenstein et. al., 2005)
- Анизотропии реликтового излучения (CMB, WMAP-5, 2008)

Вклад обычного вещества в полную плотность энергии составляет не более 4.6% - в 5 раз меньше вклада "тёмной материи" !!!

- "Тёмная материя" даёт основной вклад в тяготение на масштабах ~ 1 Мпк (~ 3 млн. св. лет - размер групп галактик)
- "Тёмная энергия" - антитяготение, она дополнительно ускоряет расширение Вселенной и начинает проявляться на масштабах более 2-3 Мпк
- Природа "тёмной материи" и "тёмной энергии" пока не ясна - это вызов всей современной космомикрорфизике

**Как рождались галактики:
роль первичных флуктуаций
и гравитационный коллапс**

Современная парадигма:

Всё многообразие наблюдаемых ныне структур возникло из **малых флуктуаций (сгустков) барионного вещества**, существовавших в эпоху рекомбинации (при $z \approx 1100$)

Однако масштаб первичных флуктуаций реликтового излучения ($\sim 10^{-5}$) **совершенно недостаточен** для формирования современных структур путём конденсации только лишь барионного вещества

Начальные флуктуации барионного вещества за счёт гравитационного коллапса могли вырасти **только в ~ 1000 раз (т.е. до уровня 1%)**, в то время как современные наблюдаемые флуктуации (т.е. галактики) на много порядков выше

Краткая история Вселенной

Time Since Big Bang

Major Events Since Big Bang

present

Era of Galaxies

stars, galaxies and clusters (made of atoms and plasma)

Humans observe the cosmos.

1 billion years

Era of Atoms

atoms and plasma (stars begin to form)

First galaxies form.

$z \sim 1100$

375000 лет
T ~ 3000K

Era of Nuclei

normal matter plus electrons

Atoms form; photons fly free

Неоднородность РИ - отпечаток этой эпохи

3 minutes

Era of Nucleosynthesis

protons, neutrons, electrons, neutrinos (antimatter rare)

Fusion ceases; normal matter is 75% hydrogen, 25% helium, by mass.

0.001 seconds

Particle Era

elementary particles (antimatter common)

Matter annihilates antimatter.

10^{-16} seconds

Electroweak Era

elementary particles

Electromagnetic and weak forces become distinct.

10^{-38} seconds

GUT Era

elementary particles

Strong force becomes distinct, perhaps causing inflation of universe.

10^{-43} seconds

Planck Era

????

neutron
proton

electron
neutrino

antiproton
antineutron

antielectrons

quarks

- Без учёта доминирующей роли холодной (легко сгущающейся под действием гравитации) тёмной материи образование галактик за время менее 2 млрд. лет было бы невозможным !
- **Парадигма холодной тёмной материи:** благодаря подавляющему вкладу в тяготеющую массу первичные очень малые ($\sim 10^{-5}$) флуктуации вначале приводят к образованию **массивных сгустков холодной тёмной материи**, в которые затем "натекают" обычное (барионное) вещество, впоследствии превращающееся в **скопления галактик, галактики и звёзды**

Моделирование крупномасштабных структур (иерархическое скучивание холодной тёмной материи вследствие гравитационной неустойчивости)

$z=28.62$

Начало расчётов:
возраст Вселенной
120 млн. лет ($z=28.62$)

Конец расчётов:
современная эпоха

Формируется
множество “субгало” –
“зародышей” галактик,
волокон и узлов –
скоплений галактик

Эволюция темной материи

$Z=28.62$

$Z=10.01$

$Z=4.97$

$Z=3.99$

$Z=3.00$

$Z=2.00$

$Z=1.00$

$Z=0.50$

$Z=0.00$

- **SDSS Legacy Survey:**

Модели очень напоминают результаты наблюдений "пены" видимого распределения галактик: узлы, волокна, пустоты ("войды")

Основные трудности сценария "тёмных субгало":

- (а) малое число известных галактик-карликов
- (б) не найдены плотные центральные сгустки темной материи ("каспы" размером ~ 1 кпк)

- Млечный Путь:
~20 спутников

- Модель: многие
сотни спутников

Жизнь и смерть звёздных систем

“Столкновения” звёзд, космические приливы,
динамическое трение и что остаётся в конце...

(На примере звёздных скоплений,
рассеянных и шаровых, в которых звёзды
связаны воедино гравитацией)

Некоторые рассеянные скопления

Плеяды = M45,
~100 млн. лет,
~120 пк

Гиады = NGC1647
~650 млн. лет,
46 пк

X+h Per =
NGC869/884,
~7 млн. лет,
~2.3 кпк

Фон ЭТИХ слайдов - тоже звездное скопление

Одно из самых
массивных и
ярчайших шаровых
скоплений нашей
Галактики -

47 Tuc = NGC 104

(КТ "Хаббл")

В нём миллионы
звезд

Шаровых скоплений
много и в других
галактиках, особенно
в гигантских
эллиптических

M87 = Дева А,
центральная галактика
сверхскопления в Деве.
Более 30000 шаровых
скоплений!

Выглядят как
звездообразные объекты

Факторы, обеспечивающие динамическую эволюцию звёздных скоплений

- Парные (но не лобовые !) сближения звёзд → "испарение" звёзд из скопления, потеря массы и энергии, сжатие
- Приливные силы со стороны Галактики и приливные "удары" → ускорение распада
- Динамическое трение в звёздном фоне → изменение орбиты, приливные эффекты, ускорение распада
- Все дороги ведут к их гибели...

Следствия обмена энергией при парных сближениях:

- увеличение скорости некоторых звёзд выше критической (аналога второй космической для скопления)
- звёзды вылетают, унося часть энергии скопления
- изменение структуры скопления: ядро скопления сжимается и скопление ускоренно распадается, за время релаксации теряя около 1% звёзд

$$\tau_{relax} \approx \frac{V^3}{100G^2 m^2 n}$$

Эти звёзды покидают скопление

Приливные силы

- Вызываются внешними по отношению к скоплению массами (галактикой, массивными молекулярными облаками, другими скоплениями и т.п.)
- Полная аналогия с лунно-солнечными приливами в земных океанах

Земные приливы - влияние Луны:

(a)

- Картина распределения внешних сил

(b)

- То же, с точки зрения земного наблюдателя

Картина приливных сил, действующих на звёздное скопление в галактике

Скопление вытягивается в плоскости орбиты и "поджимается" у полюсов → искажение формы скопления, облегчение "ухода" звёзд и сокращение срока жизни скопления

$$f_{dyn} \propto \frac{G^2 M^2 \rho}{V_M^2}$$

- **Динамическое трение:** гравитационная "фокусировка" звёзд позади движущегося массивного объекта (скопления) → **сгусток** тормозит скопление, меняет его орбиту, приводя в более плотные области галактики, где оно ещё легче разрушается приливными силами

Пример: зона "выживания" шаровых скоплений под действием различных факторов за 10 млрд. лет

- а, г) Релаксация
    - компактные или маломассивные
  - б) Приливы и гравитационные "удары"
    - "рыхлые"
  - в) Динамическое трение
    - массивные
- "Выжившие" скопления

- Сближения звёзд, приливные силы и приливные "удары", динамическое трение - все эти механизмы динамической эволюции влияют не только на звёздные скопления, но и на гораздо более массивные и крупные спутники гигантских галактик (карликовые эллиптические - $dSph$, неправильные - Irr и др.)

Эволюция массивного
(1500 звёзд) рассеянного скопления
в приливном поле Галактики
на протяжении 700 млн. лет
(наблюдатель - в скоплении)

- Центр Галактики - слева
- Скопление движется по орбите вверх
- Синие точки - звёзды большой массы
- Красные точки - звёзды малой массы

T = 47 Myar

T = 142 Myar

T = 237 Myar

T = 332 Myr

T = 474 Myar

T = 569 Myar

T = 712 Myar

- Растёт длинный (~ 1 кпк/млрд.лет) **звёздный "шлейф"**, вытянутой в обе стороны вдоль орбиты и состоящий из звёзд, в разное время покинувших скопление

- Звёзды "шлейфа" долго сопровождают скопление в его движении по орбите, они образуют длинное и обширное **"движущееся скопление"**, выделяемое по повышенной звёздной плотности и близости пространственных скоростей звёзд, а также по такому же, как и у скопления, звёздному составу
- Подобные "шлейфы" сейчас обнаружены и у распадающихся карликовых спутников Галактики

Поиск следов взаимодействия Галактики со спутниками и их распада: "малый" канныбализм

- Поиск и изучение "шлейфов" шаровых скоплений и карликовых галактик-спутников Млечного Пути, открытие его новых спутников и скоплений с помощью КТ "Хаббл" и по данным "всенебесных" обзоров SDSS, 2MASS дали в последние 10-15 лет важную информацию о процессах формирования структур в наблюдаемых ныне галактиках

Орбита и приливные "шлейфы" далекого шарового скопления Palomar 5

Диаграммы "цвет-звёздная величина":
разделение звезд "шлейфа" и фона

- Одно из слабейших шаровых скоплений Галактики - Palomar 1 и изофоты его "шлейфа" (SDSS)
- Niederste-Ostholt et al. (2010)

Коросов 1, Коросов 2 - новые шаровые скопления Галактики (Korosov et al., 2007)

- Расстояние - более 40 кпк от центра Галактики

- Leo T: вид на небе
- (SDSS)

Диаграмма ГР: много красных гигантов и голубых звёзд ГВ

- **Irwin et al. (2007)** - Leo T (dSph, карликовая сфероидальная галактика)

Поиск новых скоплений и карликовых галактик

Новое шаровое скопление Segue 1

Воо-Волопас Вид на небе

Диаграмма ГР

CVn - Гончие Псы (Zucker et al., 2007)

Zucker et al.
(2006):

Только голубые
звёзды

- Новая карликовая сфероидальная галактика **UMa II** (Большая Медведица)
- Данные SDSS и 8.2-м телескопа SUBARU (Гавайи)

- Приливные "шлейфы" галактики Sgr dSph (Стрелец) на северном (справа) и южном (слева) небе (**Korosov et al., 2011**):
- 4 ветви - последовательные витки орбиты

Диск Галактики

Приливные ветви

Солнце

СМа

СМа

Milky Way

Галактика в
СМа (Большом
Псе)

Моделирование "ветвистой" структуры распадающейся карликовой галактики

Моделирование "ветвистой" структуры распадающейся карликовой галактики

Моделирование "ветвистой" структуры распадающейся карликовой галактики

Моделирование "ветвистой" структуры распадающейся карликовой галактики

Моделирование "ветвистой" структуры распадающейся карликовой галактики

С помощью "всенебесных" обзоров открыто более десятка новых спутников Галактики

- Поиск и исследование процессов "малого" каннибализма - распада скоплений и карликовых спутников - сложнейшая наблюдательная задача
- Предполагается, что Млечный Путь в течение всей своей жизни мог "съесть" десятки (сотни ?) своих карликовых компаньонов
- Современные теории происхождения и эволюции галактик это учитывают

**Тонкий диск
из молодых звёзд**

**Толстый диск
из красных старых звёзд**

- Тонкие диски галактик: $\sim 200-300$ пк
- Толстые диски: $\sim 1000-2000$ пк
- Происхождение "толстого диска" галактик также связывают с разрушением спутников галактик (динамическое трение + приливные силы)

- **Grillmair, Donatos, 2006**: открытие потока GD-1 протяжённостью $\sim 63^\circ$ на небесной сфере:

- Очевидно, это "шлейф" шарового скопления (пока не обнаруженного)

- Обнаружение исключительно длинных "шлейфов" скоплений и карликовых спутников - уникальная находка, позволяющая восстановить форму их орбит и, следовательно, изучить распределение масс в Галактике (т.е. вид её гравитационного потенциала)

Koposov et al. (2009):

Скорость вращения
на периферии

Галактики:

$V_0 \sim 220$ км/с

Полная масса

Галактики:

~ 1000 млрд. солн.

(барионная масса в
10 раз меньше)

Сжатие тёмного
гало ~ 0.8

- Реконструкция орбиты GD-1 и наблюдения
- Кружком отмечено положение Солнца

Происхождение галактик – “большой” каннибализм

Слияния фрагментов и галактик почти равных масс – необходимый этап в процессе формирования спиральных и эллиптических галактик

История как на ладони

~1'x1'

Скопление гал. (10 млрд..лет)

Спирал. гал. (11.1 млрд. лет)

Галактика (1.4 млрд..лет) при возрасте Вселенной 13.7 млрд.лет

Слияние сгустков темной материи - основной сценарий образования "зародышей" будущих галактик в течение первых 1-2 млрд. лет

Спиральные галактики:
захват небольших фрагментов, богатых газом ?

Эллиптические галактики:
слияние фрагментов почти равных масс ?

Спиральные галактики

Эллиптические галактики

Сценарий рождения дисковой галактики (фас и профиль)

Природа вращения: сближения фрагментов

Сценарий рождения дисковой галактики (фас и профиль)

Природа вращения: сближения фрагментов

$T \sim 1$ млрд. лет

H
20kpc

Сценарий рождения дисковой галактики (фас и профиль)

Природа вращения: сближения фрагментов

$T \sim 3$ млрд. лет

20кpc

Сценарий рождения дисковой галактики (фас и профиль)

Природа вращения: сближения фрагментов

Сценарий рождения дисковой галактики (фас и профиль)

Природа вращения: сближения фрагментов

Сценарий рождения дисковой галактики (фас и профиль)

Природа вращения: сближения фрагментов

Сценарий рождения дисковой галактики (фас и профиль)

Природа вращения: сближения фрагментов

Взаимодействие галактик - общее явление во Вселенной, и одновременно - стимулятор образования звёзд из сильно сжатого газа

Galaxies NGC 2207 and IC 2163

“Тележное колесо” – кольцеобразная галактика, результат сквозного пролёта спутника; две зоны (“вспышки”) звездообразования, возбуждённого ударной волной

"Антенна": мощная
вспышка звездообразования

Colliding Galaxies NGC 4038 and NGC 4039

HST • WFPC2

PRC97-34a • ST ScI OPO • October 21, 1997 • B, Whitmore (ST ScI) and NASA

- Искажение форм, вспышки звездообразования в сблизившихся галактиках - следствие приливного разрушения и взаимодействия
- Галактики "поедают" друг друга: каннибализм в больших масштабах
- "Глубокие" обзоры показывают, что это типичное явление и для ранних этапов жизни галактик

Следы галактического "канныализма"

Пример: многоядерность в некоторых эллиптических галактиках: следствие слияния спиральных галактик?

$1 < z < 2$ (возраст Вселенной 3.3 - 6 млрд. лет)
 HST North Deep Field (Conselice et al., 2003)

$2 < z < 3$ (возраст Вселенной 2.2 - 3.3 млрд. лет)
 HST North Deep Field (Conselice et al., 2003)

Много слияний
 фрагментов
 близкой массы

- **Общий вывод: частота слияний галактик со временем падает**

Слияний гигантских галактик в прошлом (до 2.2 - 2.5 млрд. лет) было много, а сейчас их почти нет (ещё будут ?)

Слияний «малых» галактик много и сейчас

- В эллиптических галактиках газа практически нет
- **Одна из основных идей:** они могли образовываться при слиянии спиральных галактик
- Звёзды практически не ощущают столкновения галактик (кроме искажения их распределения за счёт приливных сил)
- Газ почти целиком "выметается" из системы
- **Аналогия:** столкновение подушек и шарикоподшипников

Образование гигантской эллиптической галактики при слиянии
4-х крупных галактик (Major Merger; Dubinski, 1998)
Объединяются за ~ 3 млрд. лет ($z: 2.0-0.8$)

Проекция x-y

Конечная конфигурация
(облёт)

Проекция x-z

Млечный Путь и Туманность Андромеды: что нас ждёт ?

- Близкая пара (~ 750 кпк = 2.2 млн. св. лет)
- Обе массивные: ~ 500 -1000 млрд. солн. масс
- Гигантские: поперечник ~ 150 кпк (500 тыс. св. лет)
- Сближаются со скоростью ~ 170 км/с
- Столкновение в ближайшие 2-3 млрд. лет неизбежно...

Информация к размышлению:

- Эре телескопов - 400 лет (Галилей, 1609)
- Все наши наблюдения - это всего лишь мгновенный "снимок" современного состояния Вселенной
- **Законы Физики + Логика = Объяснение происхождения и эволюции объектов дальнего космоса - это ли не доказательство могущества современной науки ?**

- **Нобелевские лауреаты последнего десятилетия по физике за работы в области астрономии:**
- **2002: R. Davies Jr., M. Koshiba, R. Giacconi** - обнаружение космических нейтрино, открытие космических рентгеновских источников
- **2006: J. Mather, G. Smoot** - открытие анизотропии космического фонового (реликтового) излучения
- **2011: S. Perlmutter, B. Schmidt, A. Rees** - открытие ускорения расширения Вселенной ("тёмной энергии")

Как стать астрономом ?

- Астрономическое отделение физического факультета МГУ – только здесь обучение астрономии начинается с 1 курса (ещё на матмехе СПбГУ, и больше нигде в мире)
- Научная база АО – ГАИШ МГУ (www.sai.msu.ru)
- Форма и срок обучения: Специалитет, 6 лет
- Магистратура – для выпускников других университетов
- Приём – 20 бюджетных и до 5 платных мест
- Экзамены: ЕГЭ (русский язык, математика, физика) + дополнительный экзамен по физике
- Льготы для призёров крупных астрономических олимпиад (Всероссийской – без экзаменов)
- Контакты:
- В.Е. Жаров zharov@sai.msu.ru
- А.С.Расторгуев rastor@sai.msu.ru

Благодарю за внимание !

- **WEB:**
- **<http://lnfm1.sai.msu.ru/~rastor/>**
- **Москва, ГАИШ МГУ, 2013**